

COVID-19: Ревакцинация.
Спрашивали?
Отвечаем.



Ревакцинация (бустерная прививка)

что это?

Повторное введение вакцины
после первичной вакцинации

зачем?

Повысить уровень защиты
организма

С каждой последующей вакцинацией
улучшается качество антител



Чем ревакцинироваться?

любой
зарегистрированной
вакциной

первым компонентом
«Гам-КОВИД-Вак»
(Спутник V)*

QR-код и сертификат
обновляются
автоматически

* при этом ревакцинация
считается завершённой.





Когда проводить ревакцинацию?

через 6 месяцев после предыдущей вакцинации

ИЛИ

через 6 месяцев после перенесенного заболевания
(в том числе у ранее вакцинированных лиц)





Кому необходимо ревакцинироваться?

● **ВСЕМ***

вне зависимости от уровня антител

* при отсутствии противопоказаний





Противопоказания определяет лечащий врач

ПОСТОЯННЫЕ

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

период грудного вскармливания;

ВРЕМЕННЫЕ

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (ревакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии).

! При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — ревакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии

! В каждом отдельном случае повторная вакцинация проводится только после осмотра врача.





Есть четкое понимание и инструкция: шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация.



Денис Проценко,
главный врач больницы No 40
в Коммунарке





Россиянам следует повторно поставить прививку от коронавируса из-за повышения заболеваемости в других странах.



***Александр Гинцбург,
директор Центра им. Гамалеи***





Надо понимать, что получение иммунитета через болезнь — это игра в русскую рулетку. С ковидом шутить не надо.



*Вадим Гершевич,
заместитель главврача
ГКБ No 1 им. Кабанова*





Если человек не переболел «Омикроном», то уже сейчас ему нужно пройти ревакцинацию. Сделать это лучше до наступления жаркого периода — в конце весны или в начале лета, чтобы легче перенести прививку.



***Евгений Тимаков,**
врач-вирусолог*





Доказано, что дополнительная вакцинация позволяет приблизить уровень иммунитета к тому, что будет эффективно даже для "Омикрона" и для его новой версии. В мире началась следующая волна, и у нас на подходе "Стелс-Омикрон". Те, кто давно переболел и давно вакцинировался, я им очень рекомендую подумать об этом, потому что отмена обязательной вакцинации не означает отмену вакцинации.



Александр Чепурнов,
*Профессор вирусологии, руководитель лаборатории
особо опасных инфекций Федерального
исследовательского центра фундаментальной
и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ)*

